

# COVID-19 SAŽETAK SMERNICA #2

## Intervencije farmaceuta u apoteci otvorenog tipa i savetovanje pacijenata

1. U mnogim zemljama, prenošenje infekcije u društvenoj zajednici postalo je glavni način prenošenja infekcije. Dok je istorija putovanja u žarišnim područjima i dalje važan kriterijum za procenu u zemljama sa nekoliko identifikovanih slučajeva ili u početnoj fazi izbijanja infekcije, on možda više neće biti relevantan kriterijum u zemljama gde se infekcija prenosi unutar zajednice.

2. Obzirom da infekcija može da se prenese sa osoba koje su asimptomatske ili presimptomatske, preporučuje se oprez sa SVIM pacijentima i kupcima koji dolaze u apoteku.

### KRITERIJUMI

- Bez prisutnih simptoma (kašalj, temperatura ili poteškoće sa disanjem)  
+
- Bez skorašnjeg kontakta sa osobom za koju se sumnja ili je potvrđeno da je zaražena virusom COVID – 19 i bez skorašnje istorije putovanja u područja koja su žarište zaraze

- Prisutni simptomi (kašalj, temperatura ili poteškoće sa disanjem)  
+
- Bez skorašnjeg kontakta sa osobom za koju se sumnja ili je potvrđeno da je zaražena virusom COVID – 19 i bez istorije putovanja u područja koja su žarište zaraze

- Bez prisutnih simptoma (kašalj, temperatura ili poteškoće sa disanjem)  
+
- Skorašnji kontakt sa osobom za koju se sumnja ili je potvrđeno da je zaražena virusom COVID – 19 i/ili skorašnje putovanje u područja koja su žarište zaraze

### INTERVENCIJE

- Umanjiti/otkloniti strah i paniku kod pacijenta
- Istaći značaj preventivnih mera
- Preporučiti izbegavanje okupljanja (socijalno distanciranje), samoizolaciju i izbegavanje putovanja koja nisu neophodna ( u zemlji i inostranstvu) kada god je to moguće.

- Umanjiti/otkloniti strah i paniku kod pacijenta
- Ukazati da postoji rizik da je pacijent zaražen COVID – 19 virusom
- Kada god je to moguće, izolovati pacijenta u zasebnu sobu
- Ne pregledati pacijenta
- Pojačati mere sopstvene zaštite nošenjem maske/respiratora<sup>1</sup>, zaštitnih naočara i rukavica
- Posebno istaći pacijentu neophodnost preduzimanja mera, poput nošenja zaštitne maske, u cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze.

- Umanjiti/otkloniti strah i paniku kod pacijenta
- Ukazati da postoji rizik da je pacijent zaražen COVID – 19 virusom
- Preporučiti socijalno distanciranje, kućni karantin i izbegavanje bilo kakvih putovanja najmanje u narednih 14 dana
- Preporučiti da se isprate sve osobe sa kojima je osoba ranije bila u kontaktu

- Pružiti informacije zasnovane na dokazima i savet (usmeno i/ili pisano)

- Preporučiti obavezno distanciranje pacijenta (čak i od članova porodice i bliskih osoba), kućni karantin i izbegavanje bilo kakvih putovanja najmanje u narednih 14 dana
- Osobama koji pripadaju visokorizičnim grupama, savetovati da se jave na dežurne brojeve telefona kako bi se obavilo testiranje i pružio odgovarajući tretman.
- Pružiti informacije zasnovane na dokazima i odgovarajući savet (usmeno i/ili pisano)
- Dezinfikujte sva potencijalno kontaminirana područja i površine

- U slučaju da se simptomi jave tokom 14 dana od kontakta sa potvrđenim ili sumnjivim slučajem, obratite se na broj za hitne slučajeve i sledite odgovarajuća uputstva
- Pružiti informacije zasnovane na dokazima i odgovarajući savet (usmeno i/ili pisano)

<sup>1</sup> termin „respirator“ u daljem tekstu odnosi se na određeni tip maske za lice

Za detaljnije informacije i reference, pogledajte smernice u celini na [www.fip.org/coronavirus](http://www.fip.org/coronavirus)

Ovaj dokument je pripremljen na osnovu dostupnih dokaza i preporuka vodećih organizacija u trenutku objavljivanja. Dokument će biti ažuriran po dobijanju novih saznanja. 26. mart 2020. godine



Preveli:

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet i  
Farmaceutska komora Srbije



- Prisutni simptomi (kašalj, temperatura ili poteškoće sa disanjem)  
+
- Skorašnji kontakt sa osobom za koju se sumnja ili je potvrđeno da je zaražena virusom COVID – 19 **i/ili** skorašnje putovanje u područja koja su žarište zaraze
- Umanjiti/otkloniti strah i paniku kod pacijenta
- Ukazati da postoji rizik da je pacijent zaražen COVID – 19 virusom
- Kada god je to moguće, izolovati pacijenta u zasebnu sobu
- Ne pregledati pacijenta
- Pojačati mere sopstvene zaštite nošenjem maske/respiratora<sup>1</sup>, zaštitnih naočara i rukavica
- Posebno istaći pacijentu neophodnost preduzimanja mera, poput nošenja zaštitne maske, u cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze.
- Preporučiti obavezno distanciranje pacijenta (čak i od članova porodice i bliskih osoba), kućni karantin i izbegavanje bilo kakvih putovanja najmanje u narednih 14 dana
- Pacijentima koji pripadaju visokorizičnim grupama, savetovati da se jave na dežurne brojeve telefona kako bi se obavilo testiranje i pružio odgovarajući tretman.
- Pružiti informacije zasnovane na dokazima i odgovarajući savet (usmeno i/ili pisano)
- Dezinfikujte sva potencijalno kontaminirana područja i površine

Za detaljnije informacije i reference, pogledajte smernice u celini na [www.fip.org/coronavirus](http://www.fip.org/coronavirus)

Ovaj dokument je pripremljen na osnovu dostupnih dokaza i preporuka vodećih organizacija u trenutku objavljivanja. Dokument će biti ažuriran po dobijanju novih saznanja. 26. mart 2020. godine

Preveli:

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet i  
Farmaceutska komora Srbije

